

INFORMACJA DLA RODZICÓW:

➤ PODSTAWOWE OBJAWY COVID-19:

- wysoka gorączka (powyżej 38 stopni C),
- kaszel,
- katar,
- duszności, trudności w oddychaniu,
- suchy kaszel,
- problemy ze wzrokiem,
- bóle mięśni.

U niektórych chorych pojawiały się także inne objawy: utrata węchu, objawy żołądkowo-jelitowe, takie jak biegunka, nudności, wymioty i ból brzucha.

➤ CZYNNIKI PODWYŻSZONEGO RYZYKA ZACHOROWANIA NA COVID-19:

- OTYŁOŚĆ

Otyłość zmniejsza wydolność płuc, dlatego pacjenci są bardziej podatni na infekcje górnych dróg oddechowych.

- POWAŻNA CHOROBA SERCA

COVID-19, podobnie jak inne choroby wirusowe, takie jak grypa, może uszkodzić układ oddechowy i utrudnić pracę serca.

- PRZEWLEKŁA CHOROBA PŁUC LUB ASTMA

Jeśli ktoś ma wcześniej występującą astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, zwłóknienie płuc lub inne schorzenia płuc, ich wydolność może być już niska, dlatego może wystąpić zwiększone zapotrzebowanie na dodatkowe dotlenienie, intubację lub potrzebę bardziej intensywnego monitorowania i wspomagania oddychania.

- CUKRZYCA

Wirus i inne organizmy rozwijają się w środowiskach o wysokiej zawartości cukru, takich jak to, które charakteryzuje cukrzyka, dlatego osoby z cukrzycą mogą zaobserwować niepokojące objawy.

- PROBLEMY Z KRZEPLIWOŚCIĄ KRWI

Osoby z problemami krzepnięcia krwi mogą być bardziej narażone na rozwój zakrzepów krwi w wyniku infekcji.

- PALENIE PAPIEROSÓW

Na ryzyko ciężkiej infekcji COVID-19 i problemy z jej leczeniem narażeni są palacze papierosów.

- UPOŚLEDZONY UKŁAD IMMUNOLOGICZNY

Wiele stanów może powodować obniżenie odporności, w tym leczenie raka, palenie tytoniu, przeszczep szpiku kostnego lub narządów, niedobory odporności, słabo kontrolowany HIV lub AIDS oraz długotrwałe stosowanie kortykosteroidów i innych leków osłabiających odporność. Choroby autoimmunologiczne, takie jak reumatoidalne

zapalenie stawów lub toczeń, są często leczone lekami immunosupresyjnymi, które hamują odpowiedź immunologiczną, zwiększając ryzyko wystąpienia różnego rodzaju infekcji.

- LECZENIE RAKA

Leki stosowane w chemioterapii nowotworów zwiększają podatność pacjenta na wszelkiego rodzaju infekcje z powodu znacznego zmniejszenia liczby komórek immunologicznych, co występuje po zażyciu tych leków. Zwiększa to ryzyko ciężkiej infekcji COVID-19.

- WIEK 65+

Starsi ludzie częściej chorują na nadciśnienie i choroby sercowo-naczyniowe, stopniowo osłabia się ich układ odpornościowy, co ułatwia czynnikowi infekcyjnemu zaatakowanie płuc lub powoduje zwiększenie ryzyka zarażeniem na COVID-19.

- PRZEWLEKŁA CHOROBA NEREK LUB DIALIZY

Osoby z chorobami nerek lub innymi ciężkimi przewlekłymi stanami chorobowymi są bardziej narażone na poważniejszy przebieg zakażenia COVID-19.

- CHOROBA WĄTROBA

Osoby z chorą wątrobą są również wrażliwsze na działanie koronawirusa.

➤ **POWIKŁANIA COVID-19**

Najgroźniejszym skutkiem i przyczyną śmierci u pacjentów z COVID-19 jest zespół ostrej niewydolności oddechowej - schorzenie prowadzące do obrzęku płuc wskutek wzrostu przepuszczalności bariery włósniczkowo-pęcherzykowej.

Powikłania po koronawirusie mogą spowodować trwałe skutki dla zdrowia:

- dolegliwości neurologiczne,
- problemy z układem trawiennym,
- problemy z funkcjonowaniem nerek,
- podwyższone ryzyko zawału serca.

Będąc świadomym ryzyka jakie niesie ze sobą zarażenie wirusem SARS-Cov-2 dla dziecka, rodziców (opiekunów) i domowników, oświadczam, że biorę odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem mojego dziecka
od dnia na zajęcia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku.

.....
Podpis rodzica